



効能又は効果ならびに用法及び用量 追加・変更のお知らせ

謹啓


時下、益々ご清祥のことと心からお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。


さて、この度小野薬品工業株式会社ならびにプリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社のヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体「オブジーボ[®]点滴静注」ならびにヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体「ヤーボイ[®]点滴静注液」におきまして、効能又は効果ならびに用法及び用量が以下のように追加・変更されましたのでご案内申し上げます。

効能又は効果ならびに用法及び用量の追加・変更

【オブジーボ[®]】

<p> 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対する 「オブジーボ[®]」と「ヤーボイ[®]」と化学療法*の併用療法、「オブジーボ[®]」と「ヤーボイ[®]」の併用療法</p>	用法及び用量一部変更
<p>切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対して他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合： オブジーボ[®]は1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注</p>	

【ヤーボイ[®]】

<p> 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対する 「オブジーボ[®]」と「ヤーボイ[®]」と化学療法*の併用療法、「オブジーボ[®]」と「ヤーボイ[®]」の併用療法</p>	新規効能又は効果追加
<p>切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対するオブジーボ[®]を含む他の抗悪性腫瘍剤との併用において、ヤーボイ[®]は1回1mg/kgを6週間間隔で点滴静注</p>	

*プラチナ製剤を含む2剤化学療法

「オブジーボ[®]」ならびに「ヤーボイ[®]」は、今後、より多くのがん患者さんの治療に貢献できるものと考えております。今後とも尚一層のご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

謹白
2020年11月

詳細は最新の添付文書をご参照ください。

薬価基準収載

抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体


オブジーボ[®] 点滴静注

20mg, 100mg, 120mg, 240mg

ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品^(注)

(注)注意—医師等の処方箋により使用すること



薬価基準収載

抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体

ヤーボイ[®] 点滴静注液

50mg

イピリムマブ(遺伝子組換え)製剤

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品^(注)

(注)注意—医師等の処方箋により使用すること

